

“USO AGRÍCOLA”



COMPOSICIÓN PORCENTUAL	Porcentaje (% m/v)
Ingredientes activos	
Torulopsis inconspicua (Equivalente a 47.665 g de I.A./L a 20° C) (Con contenido de 2.5 x 10 ⁶ UFC/ mL.)	5.00 %
Ácido acético (ácido etanoico) (Equivalente a 37.665 g de I.A./L a 20° C)	3.95 %
Acetato de metilo (Etanoato de metilo) (Equivalente a 5.719 g de I.A./L a 20° C)	0.60 %
Ácido nonadecílico (ácido nonadecanóico) (Equivalente a 1.905 g de I.A./L a 20° C)	0.20 %
Hexadecan-12-enoato de acetilo (Ester Hexadecan-12-enoato de acetilo) (Equivalente a 2.383 g de I.A./L a 20° C)	0.25 %
INGREDIENTES INERTES:	90.00
Diluyente	
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-MEZC-FUNG-0399T-1391-X0046-013-10.0

“PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL”

“PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA”

“PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN”



PRECAUCIÓN



organagro.mx

Carr. Panamericana Km 284
2da. Fracción de Crespo, 38110 | Celaya, Gto.
461192 0600

GRUPO
LUCAVA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”

LIQUIDER es un bactericida útil para el control de la plaga aquí indicada.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIONES
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
Chile Jitomate Papa Pimiento Tomate (SL)	Mancha bacteriana	Xanthomonas vesicatoria	1.5 – 2.0	Realizar 3 aspersiones al follaje a intervalo de 7 días. Volumen de aplicación 600 L de agua /Ha



() Intervalo de seguridad entre la última aplicación y cosecha SL Sin límite.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: puede reentrarse al cultivo tratado una vez que la aspersión se ha secado.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Con el equipo de protección indicado en el apartado de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”, Abra el envase de **LIQUIDER**, gire la tapa hasta romper el anillo de plástico, con la misma tapa de forma invertida colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girando la tapa para romper totalmente el sello. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque de aplicación. Adicione la dosis recomendada del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua.

CONTRAINDICACIONES:

No se aplique en horas de calor intenso, si hay probabilidad de lluvia próxima, o si la velocidad del viento es alta (más de 10 K/h).

FITOTOXICIDAD:

LIQUIDER no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD:

No se recomienda **LIQUIDER** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, Sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”:

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.