



COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

Ingrediente activo:

Hongos micorrízicos *arbusculares Rhizophagus irregularis*

100 propágulos/g

Esporas/Kg ----- 30,000/60,000



“HECHO EN MÉXICO”

“INSTRUCCIONES DE USO”

MICELIUM es un producto basado en hongos micorrízicos arbusculares que se asocian de forma natural con las raíces y funcionan como una extensión de la misma. Su función es solubilizar y transportar a la planta fósforo y minerales esenciales que para la raíz son difíciles de obtener, permitiendo una mayor captación de agua y nutrientes minerales. Además, compite contra hongos nocivos (patógenos), reduciendo su efecto negativo contra las plantas.



CULTIVO	DOSIS (kg/ha)
Solanaceae: chile, chile bell, jitomate, tomate de cáscara, tabaco, papa, berenjena. Curbitaceae: melón, pepino, sandía, calabacita, calabaza, chayote. Alliaceae: cebolla, poro. Amaryllidaceae: ajo, cebollín. Apiaceae: apio. Asteraceae: lechuga. Brassicaceae: col o repollo, coliflor, brócoli. Chenopodiaceae: betabel, acelga, espinaca. Cruciferae: rábano. Liliaceae: espárrago. Umbelliferae: zanahoria. Ornamentales y viveros	2 kg / aplicación

Época de aplicación: Realice dos aplicaciones, la primera aplicación durante la etapa de formación de plántula por inmersión o drench al sustrato y la segunda aplicación como refuerzo, al momento del transplante en drench.

“MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO”

Una vez que cuente con el equipo de protección, abra el envase.

1a aplicación - plántula:

Mezcle en agua la dosis requerida de **MICELIUM**, dependiendo del número de plántulas. Normalmente se utilizan 200 L de agua/Ha. Agite perfectamente. Llene la bomba aspersora de tipo mochila, y sin boquilla, aplique a chorro, dirigido a la base de la planta. Agite el tambo previamente a cada llenado de la mochila.

2a aplicación - transplante. Se puede aplicar en 2 formas:

a) Por inmersión- Mezcle en agua la dosis requerida de **MICELIUM**, dependiendo de la superficie a sembrar, normalmente se usan 200 L de agua/Ha. Agite perfectamente y continuamente. Moje la base de cada plántula en la mezcla, mediante inmersión y proceda a sembrar.

b) Por drench- Mezcle en agua las dosis requeridas de **MICELIUM**, dependiendo de la superficie a sembrar, normalmente se usan 200 L/Ha. Agite perfectamente. Llene la bomba aspersora de tipo mochila, y sin boquilla, aplique a chorro dirigido a la base de la planta. Agite el tambo previamente a cada llenado de la mochila.

INCOMPATIBILIDAD

Aunque **MICELIUM** es resistente a muchos fungicidas de uso común, se recomienda no aplicarlo simultáneamente con estos. Se puede aplicar con 2-3 días de diferencia entre uno y otro.